


Od jakiego zwierzęcia można się zarazić



## Jak zachowuje się zakażone zwierzę?

- JEST AGRESYWNE
- NIE BOI SIĘ
- MA ŚLINOTOK
- DZIWNIE SIĘ ZACHOWUJE



# NIE ZNASZ MNIE?

# NIE KARM!


# NIE GŁASZCZ!

# NIE PODCHODŹ!



# UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



Nie karń drobia na zewnątrz budynków inwentarskich.

Porzuć ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Nie wykorzystuj do pojęcia drobia wody ze zbiorników, do których mają dostęp drakie ptaki.

Po każdym kontakcie z drobnem lub drakimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.

W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobia stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.

Stosuj metody dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach utrzymywanej jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.

Zabierz budynki, w których utrzymywane jest drób oraz paszę przed dostępowaniem drakich, w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.



## CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA (BTV)

informacja dla hodowców bydła owiec i kóz

**Choroba niebieskiego języka (*Bluetongue*)** jest zakaźną chorobą przeżuwaczy, zarówno domowych jak i dzikich (chorują na nią bydło, owce i kozy, ale także sarny, jelenie, łosie, afrykańskie antylopy, wielbłądy, słonie), wywoływaną przez wirus z rodzaju *Orbivirus* (*Reoviridae*). Zwierzęta nie zarażają się bezpośrednio od siebie, a jedynie poprzez owady kłująco-ssące z rzędu muchówek, rodzaju kuczmany (*Culicoides*) oraz poprzez krew lub nasienie.

**Na terytorium Polski choroba niebieskiego języka podlega obowiązkowi zwalczania.**

**Choroba nie przenosi się na inne gatunki zwierząt gospodarskich i domowych oraz na ludzi, co oznacza, że mięso, mleko, skóry i wełna oraz inne produkty pochodzące od przeżuwaczy nie stanowią zagrożenia dla ludzi.**

**Objawy:**

**Bydło** zakaża się znacznie częściej niż owce, aczkolwiek bydło choruje rzadko. Ponadto choroba ta u bydła przebiega w łagodniejszej postaci niż u owiec. Po przechorowaniu bydło może stać się nosicielem zarazki, co prowadzi do zakażenia kuczmanów i przenoszenia wirusa za ich pośrednictwem na zwierzęta zdrowe.

Z uwagi na długi okres wylęgania choroby objawy kliniczne u bydła mogą nie być widoczne nawet do 60-80 dnia po zakażeniu. Jednakże jeśli wystąpią, można zaobserwować:



- Gorączkę
- ślinotok,
- zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej,
- owrzodzenie opuszki zębowej i niekiedy końca języka
- zapalenie koronki i tworzywa racic, będące przyczyną kulawizny
- u krów mlecznych - łuszczenie się naskórka strzyków i tworzenie się strupów
- ronienia
- rodzenie zdeformowanych cieląt, przy czym deformacje dotyczą najczęściej głowy. Na zakażenie najbardziej podatne są płody w okresie rozwoju mózgu.